



图1 文县海桐 1. 果枝; 2. 果实纵剖; 3. 果实横剖; 4. 种子。(白建鲁绘)

Fig. 1 *Pitosporum wenzianense* G. H. Wang et Lian. 1. fruiting branch;
2. vertical section of capsule; 3. cross section of capsule; 4. seed.

倒卵形或狭倒卵形, 3~5 枚簇生枝顶, 长 3.5~7 cm, 宽 2~2.5 cm, 先端圆钝或平截, 基部变狭, 上面深绿色, 略发亮, 下面灰绿色; 中脉在上面微凹, 在下面凸起, 侧脉 5~8 对, 两面明显, 网眼宽 2~4 mm; 叶柄长 5~12 mm。蒴果单生枝顶, 椭圆形, 纵径 1.5~2 cm, 横径 1.1~1.4 cm, 背缝线不隆起, 3 瓣裂, 果瓣薄, 厚约 1 mm, 胎座着生处较厚; 子房柄短,

长约 1.5 mm;花柱宿存,长 2 mm。种子约 22 粒,不规则卵形或阔卵形,红棕色,长 4~6 mm,宽 3~4 mm,种柄长 1 mm。

本种与光叶海桐 *P. glabratum* Lindl. 近缘,但本种叶倒卵形或狭倒卵形,先端圆钝或平截,叶脉在两面明显,网眼宽 2~4 mm,蒴果长 1.5~2 cm,种子较多达 22 粒,种柄长仅约 1 mm,可以区别。

本种又与海桐 *P. tobira* (Thunb.) Ait. 近缘,但本种全株无毛,蒴果单生枝顶,果片较薄,厚约 1 mm,可以区别。